

INSTRUKCJA UŻYCIA

Zastosowanie

- Wyrób medyczny **SANPROBI[®] FEMI⁺** jest przeznaczony do wzmocnienia naturalnej flory bakteryjnej pochwy poprzez zapobieganie lub łagodzenie wszelkich zaburzeń jej równowagi.

Zawartość opakowania

- 5 kapsułek dopochwowych.

Skład

- Każda kapsułka zawiera: $1,65 \times 10^9$ cfu dalej wymienionych szczepów bakterii: *Bifidobacterium bifidum* W28, *Lactobacillus acidophilus* W70, *Lactobacillus brevis* W63, *Lactobacillus helveticus* W74, *Lactobacillus plantarum* W21, *Lactobacillus salivarius* W24; celuloza mikrokrystaliczna, stearynian magnezu, laktoferyna. Nie zawiera konserwantów.

Wskazania do stosowania


- Wyrób medyczny **SANPROBI[®] FEMI⁺** jest przeznaczony do wzmocnienia naturalnej flory bakteryjnej pochwy poprzez zapobieganie lub łagodzenie wszelkich zaburzeń jej równowagi, co powstrzymuje wzrost bakterii patogennych i zapobiega występowaniu oraz nawrotom stanów zapalnych pochwy.

Warunki przechowywania

-  25°C Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Sposób użycia


- Sprawdź czy kapsułka nie jest uszkodzona. Wprowadź kapsułkę do pochwy wieczorem, przed snem. W celu uzyskania maksymalnej skuteczności oraz wygody stosowania wyrobu medycznego i zapewnienia jego właściwego umiejscowienia, należy włożyć kapsułkę głęboko do pochwy. W przypadku występowania suchości pochwy, należy przed aplikacją zwilżyć kapsułkę w wodzie o temperaturze pokojowej. Sposób aplikacji kapsułki przedstawiony jest na rycinie.



SANPROBI[®] FEMI⁺ należy stosować przez 5 dni od dnia zakończenia miesiączki. W przypadku braku miesiączki **SANPROBI[®] FEMI⁺** stosuje się przez 5 dni zaczynając od dowolnego dnia tygodnia. Przerwa pomiędzy cyklami przyjmowania **SANPROBI[®] FEMI⁺** powinna wynosić co najmniej 4 tygodnie.

SANPROBI[®] FEMI⁺ należy stosować najdłużej przez trzy następujące po sobie miesiące (tylko 5 dni w danym miesiącu).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-  Kapsułka do jednorazowego użytku. Wyrób medyczny **SANPROBI[®] FEMI⁺** nie był badany u kobiet w ciąży i dlatego nie zaleca się używać go przez kobiety ciężarne. Nie stosować po upływie terminu ważności. W przypadku utrzymywania się dolegliwości podczas stosowania **SANPROBI[®] FEMI⁺**, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Wyrób medyczny zawiera śladowe ilości mleka. Nie należy stosować **SANPROBI[®] FEMI⁺** jeśli występuje uczulenie na któryś ze składników wyrobu medycznego. Nie stosować jeśli kapsułka jest uszkodzona. Nie stosować dłużej niż przez trzy kolejne miesiące.

Działania niepożądane

- Po zaaplikowaniu kapsułki, w rzadkich przypadkach, może wystąpić podrażnienie błony śluzowej pochwy. Po aplikacji kapsułki, może się pojawić biała wydzielina z pochwy. Objaw ten występuje często w przypadku stosowania kapsułek dopochwowych i nie wpływa na skuteczność wyrobu medycznego.

WYTWÓRCA

 **Windlove B.V.**, Hulstweg 11,
1032 LB Amsterdam, Holandia

Sanprobi Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kurza Stopka 5/C, 70-535 Szczecin
tel. +48 91 8123804, fax +48 91 8123805
www.sanprobi.pl